

Examenvragen KVC 3.1 MKV 2025-2026

Cardio

1. Angulus sterni is:

- a. Aansluiting eerste rib
- b. Aansluiting tweede rib**
- c. Verbinding met clavicula
- d. ...



2. Foto:

- a. Pectus excavatum
- b. Pectus carinatum**
- c. Barrel chest
- d. Kyfosciose

3. Waar zetten we onze stethoscoop als we luisteren naar Erbs point?

- a. 2e ICL parasternaal
- b. 2e ICR parasternaal
- c. 3e ICL parasternaal**
- d. 3e ICR parasternaal

4. Thv 2e ICR was er een souffle te horen eind-diastolisch alsook in de carotiden, dit is te wijten aan:

- a. Aortaklepstenose
- b. Mitralisklepregurgatie
- c. Aortaklepinsufficiëntie**
- d. Pulmonalisklepstenose

5. Wat geeft een verhoogde CDV?

- a. Nierinsufficiëntie
- b. Linkerhartfalen
- c. Longembolie**
- d. ...

Pneumo

1. Wat is ruimte van Traube?

Tympanische tonen

- ontstaan boven de met lucht gevulde buikorganen
- ze zijn hoogfrequent, lang aanhoudend en muzikaal door de aard van de bijtonen.
- Tympanische percussietonen worden bij geen enkele long- of pleura-aandoening waargenomen en zijn altijd afkomstig van buikorganen. Op de voorzijde van de thoraxholte wordt dit geluid waargenomen op de plaats van de maagfundus (ruimte van Traube).



Ruimte van Traube

2. Welke van de onderstaande hebben minst waarschijnlijk kans op een spontane pneumothorax?
 - a. COPD
 - b. Marfan
 - c. Astma
 - d. ...

→ weet de opties niet precies meer, maar besteed hier dus aandacht aan
3. Kindje met een temperatuur van 39°C komt bij de spoed. Bij auscultatie hoort met perifeer normale? tonen maar mediaal matte tonen, waar pleurale wrijving te horen is. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak?
 - a. Tamponade
 - b. Pneumonie**
 - c. Pneumothorax
 - d. ...
4. Welke reden om meteen naar spoed te sturen
 - a. Temperatuur van 42°
 - b. Verlaagde bewustzijn
 - c. Gebruik van hulpademhalingspijpen
 - d. Alle van bovenstaande**
5. Vrouw komt op consultatie en klaagt van dyspnee in de avond met hartkloppingen. Parameters: BD 120/80, AHF normaal, normale crepitaties. Wat is hier waarschijnlijk aan de hand?
 - a. LHF
 - b. Geen longaandoening**
 - c. Longfibrose
 - d. ...

Gastro-entero

1. Bij palpatie in linker hypochondrium was een worstvormig structuur te vinden, meest waarschijnlijk;
 - a. Abnormaal, tumor
 - b. Normaal, stoelgang
 - c. Abnormaal, ...
 - d. Normaal, colon descendens
2. Vrouw met icterus, wat vermoed je te zien bij klinisch onderzoek?



a. spider naevi



b. petechiën



- c. trommelvingers
 - d. **Geen van bovenstaande**
3. Koliekpijn is meest kenmerkend:
- a. S nachts
 - b. **Intermediair**
 - c. Continue
 - d. ...
4. Foto van abdomen met sterretje thv van een gegeven regio. Hier was die vlak boven de navel gesitueerd: regio umbilicalis
5. Kind viel van haar paard en roep luid op dat ze zeer veel pijn heeft. Ze kreeg een stamp in de buik. Bij palpatie is de buik hard en opgezet, BD 80/40. Ze klaagt ook van pijn in de linkerschouder.
- a. Pneumothorax
 - b. **Miltruptuur**
 - c. Leverschade
 - d. ...
6. Man rectaal onderzoek waarbij fel rood bloedverlies
- a. Rectaalpoliep
 - b. Rectaaltumor
 - c. Hemorroïden
 - d. ...

Gynaeco

- 1. Wat is teken van Chadwick
 - a. Spleet vorm opening junctie
 - b. Pin-point
 - c. **Blauw-grijs verkleuring cervix**
 - d. ...
- 2. Manier inbrengen speculum
 - a. Open en recht
 - b. Gesloten recht
 - c. **Gesloten in draaibeweging naar horizontaal gebracht**
 - d. ...
- 3. Slingerpijn
 - a. Ovariumcyste
 - b. **Extra-uteriene zwangerschap (= acuut gynaecologisch probleem)**
 - c. ...

Neuro

- 1. Veel vragen over centraal en perifeer vestibulair uitval, nystagmus met trage en snelle saccades

2. Patiënt komt op consultatie bij de huisarts en klaagt van heesheid. Bij klinisch onderzoek wanneer de patiënt Aaaahh zegt ziet de arts dat het zachte verhemelte naar rechts optrekt.
 - a. **Verminderde braakreflex links, longtoptumor links**
 - b. Vermeerderen braakreflex links, longtoptumor links
 - c. Verminderde braakreflex rechts, longtoptumor rechts
 - d. Vermeerderen braakreflex rechts, longtoptumor rechts
3. Dysartrie en dysfagie
 - a. Zijn synoniemen
 - b. Dyfagie is waar je geen articulatie hebt, dysartrie wel
 - c. Dysfagie heb je normale taal, dysartrie niet
 - d. **Dysartrie is niet kunnen articuleren, ze hebben niet dezelfde betekenis**
4. Motorische spraak van Broca
 - a. Temporaal
 - b. Occipitaal
 - c. **Frontaal**
 - d. ...
5. N. oculomotorius uitval
 - a. **Ptosis, diplopie, mydriase, afwezige lichtreflex**
 - b. ...

NKO

1. Vraag over de head-impuls test, met saccades naar links...
2. Wat is geen risicofactor bij leukoplakie?
 - a. Ouder dan 40 jaar
 - b. **Vrouw zijn**
 - c. Roker
 - d. ...
3. Waarom pijn bij inbrengen van neusspeculum?
 - a. **Speculum naar neusseptum gericht**
 - b. Te ver craniaal
 - c. Te ver open
 - d. ...
4. Random vraag over de parotisklier en waar dat die uitmondt...
 - a. uitmonding tegenover de 2e bovenmolaar

Ortho

1. Welke ziekte zie je hier? Dupuytren



2. Distale femur gaat naar lateraal, distale tibia gaat naar mediaal, welke test voeren we uit voor de knie?
 - a. Valgusstress, testen mediale collaterale band
 - b. Valgusstress, testen laterale collaterale band
 - c. Varusstress, testen mediale collaterale band
 - d. **Varusstress, testen laterale collaterale band**
3. Bij de varusstress test voelen we naar? Laterale gewrichtsspleet
4. Voor mediale meniscus te testen:
 - a. Knie en heup in maximale extensie, onderbeen exorotatie, naar flexie gebracht
 - b. **Knie en heup in maximale flexie, onderbeen exorotatie, naar extensie gebracht**
 - c. Knie en heup in maximale flexie, onderbeen endorotatie, naar extensie gebracht
 - d. Knie en heup in maximale extensie, onderbeen in endorotatie, naar flexie gebracht
5. Bij valgusstress test ervaart de patiënt pijn en is de mediale gewrichtsspleet voelbaar met knie in 30° flexie en extensie, wat is hier aan de hand?
 - a. Verrekking van mediale collaterale band
 - b. Geïsoleerde ruptuur van mediale collaterale band
 - c. **Letsel van mediale collaterale ligament, posteromediaal gewrichtskapsel en posterior kruisband**
6. Hoek tussen femurkop en trochanter major is kleiner dan 125°
 - a. **Coxa vara**
 - b. Coxa valga
 - c. Genua vara
 - d. Genua valga
7. Atrofie van de duimmuis wijst op letsel van ...
 - a. n. ulnaris
 - b. n. radialis
 - c. **n. medianus**
 - d. ...
8. Tinel teken thv cubitale tunnel, positief bij inknelling van:
 - a. **n. ulnaris**
 - b. n. radialis
 - c. n. medianus
 - d. ...
9. Skater valt en landt op rechterhand en pols. Hij hoorde een krak, zag bleek ...
 - a. Consensuele reactie
 - b. **Vasovagale reactie**
 - c. Orthostatisch
 - d. ...



10. Foto:
- a. Hallux varus
 - b. Hallux valgus**
 - c. Overriding tweede teen
 - d. ...
11. Wat is geen weerstand test?
- a. Neer**
 - b. O'Brien
 - c. Jobe
 - d. Hawkins
12. Pijn thv tuberculum ischiadicum
- a. Adductorspieren
 - b. Abductorspieren
 - c. Hamstrings**
 - d. ...
13. Jendrassik-manoeuvre
- a. Versterken pijn
 - b. Versterken peesreflexen**
 - c. Verminderen
 - d. ...
14. Iemand is gevallen met zijn ski's en zijn vriend dat een arts is wil zijn knie onderzoeken maar de knie is meteen opgezet en hij vermoedt dus een articulaire bloedingstorting, hemarthrose . Wat is meest waarschijnlijk gescheurd?
- a. Mediale meniscusscheur
 - b. Achterste kruisband
 - c. Voorste Kruisbandruptuur**
 - d. Mediale collaterale band